


# DOKUMENTATION PFLERISCHER NEUROSTATUS WÄHREND SYSTEMISCHER LYSE THERAPIE

Pati.-Name: \_\_\_\_\_  
Geb.-Datum: \_\_\_\_\_



Laufzeit (Min.)	RR (syst./diast.)	HF	AF	SpO2	Temp	BZ	Vigilanz	Pupillengröße		Pupillenreaktion		Sprache/ Sprechen	Motorik		Sensibilität	Bemerkungen
								rechst	links	rechts	links		Re Arm	Li Arm		
0																
15																
30																
45																
60																
75																
90																
105																
120																

**Wichtige akute Nebenwirkungen => sofortige Info ärztlicher Dienst!**

- Klinische Verschlechterung
- (inkl. starker Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen, plötzliche hypertensive Entgleisung, neurologische Verschlechterung, Vigilanzminderung)
- Blutungen aller Art
- Allergische Reaktionen
- Orolinguales Angio-Ödem
- Sonstige Komplikationen

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

**Legende Neuro-Status/Vigilanz** w = wach / som = somnolent (benommen, aber erweckbar) / sop = soporös (nur auf Schmerzreiz erweckbar) / k = komatös (auch auf Schmerzreiz nicht erweckbar)  
**Pupillengröße** e = eng / m = mittelweit / w = weit / x = entrundet  
**Pupillenreaktion** + = prompt / (+) = träge / - = fehlend  
**Sprache/Sprechen** 0 = normale Kommunikation / 1 = eingeschränkte Kommunikation, aber noch verständlich / 2 = unverständliche verbale Äußerungen / 3 = keine Sprachäußerung, Pat. ist stumm  
**Motorik** 0 = kein Absinken; 1 = leichtes Absinken. Unterlage wird jedoch nicht berührt; 2 = Absinken auf die Unterlage innerhalb von 10s (Arm) bzw. 5s (Bein); 3 = Bewegung, aber kein Anheben gegen Schwerkraft; 4 = keine Bewegung  
**Sensibilität** 0 = normal / 1 = Hypästhesie / 2 = Anästhesie --> unter Bemerkungen bitte Lokalisation angeben  
**Weitere Symptome/Bemerkungen** z.B. Blickwendung (BW), Hemianopsie (HA), Faciale Parese (FP), Woffindungsstörungen (WFS), Aphasie (A), Dysarthrie (D), Feinmotorikstörung (FMS), Neglect (N), Anosognosie (AO), Desorientiertheit (DO)

**Berechnungstabelle für Actilyse®-Dosierung**

Pat. kg	Lyse Bolus mg	Inf. Rate ml/h	Dosis insg. mg	Pat. kg	Lyse Bolus mg	Inf. Rate ml/h	Dosis insg. mg
50	4,5	40,5	45	63	5,7	51,3	57
51	4,6	41,4	46	64	5,8	52,2	58
52	4,7	42,3	47	65	5,9	53,1	59
53	4,8	43,2	48	66	5,9	53,1	59
54	4,9	44,1	49	67	6,0	54,0	60
55	5,0	45,0	50	68	6,1	54,9	61
56	5,0	45,0	50	69	6,2	55,8	62
57	5,1	45,9	51	70	6,3	56,7	63
58	5,2	46,8	52	71	6,4	57,6	64
59	5,3	47,7	53	72	6,5	58,5	65
60	5,4	48,6	54	73	6,6	59,4	66
61	5,5	49,5	55	74	6,7	60,3	67
62	5,6	50,4	56	75	6,8	61,2	68

Lyse-Gesamtdosis (verabreicht): \_\_\_\_\_ mg  
 Lyse-Abbruch/Pause: \_\_\_\_\_ Uhr  
 ggf. bis \_\_\_\_\_ Uhr  
 Grund: \_\_\_\_\_  
 Pflegekraft (Hz): \_\_\_\_\_